



NUTRIPISCIS TR 32 4 A 6MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para tilápias cultivadas em viveiros escavados, tanques-rede e raceways, com peso de 100 a 300g.

MODO DE USAR: fornecer sobre toda área de cultivo, 2 a 4 vezes ao dia, em 4 a 5% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo, condições ambientais e as metas de produção.

NUTRIPISCIS TR 32 6 A 8MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para alimentação de tilápias com peso médio acima de 300g, cultivadas em viveiros com alta densidade de estocagem, tanques-rede e raceways.

MODO DE USAR: fornecer sobre toda a área de cultivo, 2 a 4 vezes ao dia, em taxas de alimentação de 2 a 4% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo alimentar, condições de cultivo e metas de produção.

NUTRIPISCIS TR 32 T 4 A 6MM E NUTRIPISCIS TR 32 HT 4 A 6MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para alimentação de tilápias com peso médio entre 100 e 300g, cultivadas em viveiros com alta densidade de estocagem, tanques-rede e raceways.

MODO DE USAR: fornecer sobre toda a área de cultivo, 2 a 4 vezes ao dia, em taxas de alimentação de 4 a 5% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo alimentar, condições de cultivo e metas de produção.

NUTRIPISCIS TR 32 T 6 A 8MM E NUTRIPISCIS TR 32 HT 6 A 8MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para tilápias cultivadas em viveiros escavados, tanques-rede e raceways, com peso acima de 300g.

MODO DE USAR: fornecer sobre toda área de cultivo, 2 a 4 vezes ao dia, em 2 a 4% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo, condições ambientais e as metas de produção.



BIOTRUTAS 44% 3 A 4MM

INDICAÇÃO DE USO: ração indicada para fase inicial de criação, para peixes com até 20cm de comprimento.

MODO DE USAR: fornecer na proporção de 5 a 8% da biomassa existente no tanque, dividida em 4 tratos diários, sempre nos mesmos horários.

BIOTRUTAS 42% 10 A 12MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes carnívoros na fase de engorda.

MODO DE USAR: fornecer sobre toda a área de cultivo, 3 a 4 vezes ao dia, em taxas de 2 a 4% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo alimentar, condições de cultivo e metas de produção.

BIOTRUTAS 42 ASTX 10 A 12MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes carnívoros na fase de engorda.

MODO DE USAR: fornecer sobre toda a área de cultivo, 3 a 4 vezes ao dia, em taxas de 2 a 4% da biomassa. Ajustar a quantidade conforme o consumo alimentar, condições de cultivo e metas de produção.

Níveis Nutricionais	Umidade (máx.) g/kg	Proteína Bruta (mín.) g/kg	Extrato Etéreo (mín.) g/kg	Fibra Bruta (máx.) g/kg	Matéria Mineral (máx.) g/kg	Cálcio (mín.) g/kg	Cálcio (máx.) g/kg	Fósforo (mín.) mg/kg	vitamina C (mín.) mg/kg	Sódio (mín.) mg/kg	Mananoligossacarídeo (mín.) g/kg	Beta-glucanas (mín.) g/kg
LAGUNA LARVAS E PÓS-LARVAS 55 FARELADA	130	550	90	40	200	25	40	20.000	720	-	-	-
LAGUNA CARNÍVOROS CRESC. 45 4 A 6MM	120	450	120	45	140	15	25	10.000	600	-	-	-
LAGUNA CARNÍVOROS ENG. 40 6 A 8MM	120	400	100	45	130	10	25	10.000	700	-	-	-
LAGUNA CARNÍVOROS ENG. 40 8 A 10MM	120	400	100	45	130	10	25	10.000	700	-	-	-
NUTRIPISCIS ALEVINOS 36 2 A 3MM	120	360	70	50	140	10	25	6.000	350	-	-	-
NUTRIPISCIS JUVENIL 36 3 A 4MM	120	360	70	50	140	10	25	6.000	350	-	-	-
NUTRIPISCIS ALEVINOS 45 2 A 3MM	120	450	80	40	150	20	30	8.000	600	-	-	-
LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 32 4 A 6MM	120	320	50	50	140	15	30	6.000	270	-	-	-
LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 32 6 A 8MM	120	320	50	50	140	15	30	6.000	270	-	-	-
LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 32 8 A 10MM	120	320	50	50	140	15	30	6.000	270	-	-	-
LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 28 6 A 8MM	130	280	40	100	140	10	30	2.000	150	-	-	-
LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 28 8 A 10MM	130	280	40	100	140	10	30	2.000	150	-	-	-
BIOTRUTAS 44% 3 A 4MM	120	440	80	40	150	23	45	14.000	450	-	-	-
BIOTRUTAS 42% 10 A 12MM	120	420	90	40	150	25	35	13.000	300	4.000	-	-
BIOTRUTAS 42 ASTX 10 A 12MM	120	420	90	40	150	25	35	13.000	300	-	-	-
NUTRIPISCIS TR 32 T 4 A 6MM	130	320	70	50	120	10	22	8.000	600	-	-	-
NUTRIPISCIS TR 32 T 6 A 8MM	130	320	70	50	120	10	22	8.000	600	-	-	-
NUTRIPISCIS TR 32 4 A 6MM	120	320	60	55	120	5	25	6.000	300	-	-	-
NUTRIPISCIS TR 32 6 A 8MM	120	320	60	55	120	5	25	6.000	300	-	-	-
NUTRIPISCIS TR 32 HT 4 A 6MM	120	320	75	45	120	10	20	3.000	800	-	-	-
NUTRIPISCIS TR 32 HT 6 A 8MM	120	320	75	45	120	10	20	3.000	800	-	-	-
NUTRIPISCIS IMMUNITY+ 2 A 3MM	120	365	60	50	140	10	20	8.000	700	-	0,05	0,06
NUTRIPISCIS IMMUNITY + 3 A 4MM	120	365	60	50	140	10	20	8.000	700	-	0,05	0,05

Transformando necessidades em soluções!





LAGUNA LARVAS E PÓS-LARVAS 55 FARELADA

INDICAÇÃO DE USO: ração extrusada e moída para pós-larvas de peixes.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes em fase de pós-larvas até 30 dias. A quantidade diária oferecida deve variar de 15 a 20% da biomassa, dividida em 8 porções.

LAGUNA CARNÍVOROS CRESCIMENTO 45 4 A 6MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes carnívoros em fase de crescimento.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes de 60 a 260g. A quantidade diária oferecida deve variar de 3 a 4,5% da biomassa, dividida em 4 porções.

LAGUNA CARNÍVOROS ENGORDA 40 6 A 8MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes carnívoros.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes de 250 (6 mm) a 850g. A quantidade diária oferecida deve variar de 1 a 3% da biomassa, dividida em 2 ou 3 porções.

LAGUNA CARNÍVOROS ENGORDA 40 8 A 10MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes carnívoros.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes acima de 850g. A quantidade diária oferecida deve variar de 1 a 3% da biomassa, dividida em 2 ou 3 porções.



LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 32 4 A 6MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes onívoros cultivados em viveiros escavados em fase engorda com peso de 100 a 300g.

MODO DE USAR: fornecer de 3 a 6% do peso vivo, dividida em 3 a 4 porções por dia.

LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 32 6 A 8MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes onívoros cultivados em viveiros escavados em fase engorda com peso de 300 a 1.000g.

MODO DE USAR: fornecer de 2 a 4% do peso vivo, dividida em 3 a 4 porções por dia.

LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 32 8 A 10MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes onívoros cultivados em viveiros escavados em fase engorda, com peso acima de 1kg.

MODO DE USAR: fornecer de 1 a 3% do peso vivo, dividida em 3 a 4 porções por dia.

LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 28 6 A 8MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes onívoros.

MODO DE USAR: distribuir para peixes de 200 a 700g. A quantidade diária oferecida deve variar de 1,5 a 5% da biomassa, dividida em 2 a 4 porções.

LAGUNA PEIXES BRASILEIROS 28 8 A 10MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes onívoros.

MODO DE USAR: distribuir para peixes acima de 700 gramas. A quantidade diária oferecida deve variar de 1,5 a 5% da biomassa, dividida em 2 a 4 porções.



NUTRIPISCIS IMMUNITY+ 2 A 3MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes na fase de alevinos e juvenis.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes onívoros de 10 a 50g de peso. A quantidade diária oferecida deve variar de 6 a 10% da biomassa, dividida em 5 a 6 porções. Fornecer 15 dias antes do manejo de vacinação e manejos de rotina e 15 dias após.

NUTRIPISCIS IMMUNITY + 3 A 4MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes na fase de alevinos e juvenis.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes onívoros de 50 a 120g de peso. A quantidade diária oferecida deve variar de 6 a 10% da biomassa, dividida em 5 a 6 porções. Fornecer 15 dias antes do manejo de vacinação e manejos de rotina e 15 dias após.



NUTRIPISCIS ALEVINOS 36 2 A 3MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes na fase de alevinos.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes onívoros de 20 a 70g de peso. A quantidade diária oferecida deve variar de 6 a 10% da biomassa, dividida em 5 a 6 porções.

NUTRIPISCIS JUVENIL 36 3 A 4MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes na fase de juvenis.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes onívoros de 30 a 100g de peso. A quantidade diária oferecida deve variar de 6 a 10% da biomassa, dividida em 5 a 6 porções.

NUTRIPISCIS ALEVINOS 45 2 A 3MM

INDICAÇÃO DE USO: ração para peixes na fase de alevinos.

MODO DE USAR: distribuir aos peixes de 15 a 50g. A quantidade diária oferecida deve variar de 4,5 a 9% da biomassa, dividida em 6 porções.



SAC 0800 7041241

@ADMNUTRICAOUNIMAL

DIGITALNA@ADM.COM